

RIESGOS Y COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS

MIRINGOTOMIA E INSERCIÓN DE DIABOLOS

- Insición de la membrana timpánica e inserción de tubos de plástico.

ADENOIDECTOMIA (Y/O AMIGDALECTOMIA)

- Ecsición de adenoides y/o amígdalas

- ***Infección***

Una infección ótica puede sobrevenir a la colocación de diábolos. Esto es fácilmente controlado en la gran mayoría de casos con antibióticos.

- ***Pérdida de audición***

Es muy raro que quede una pérdida permanente de audición a continuación de colocar diábolos.

- ***Perforación timpánica***

La colocación de diábolos se hace para dejar una perforación temporaria del tímpano. En raras ocasiones cuando el diábolo es rechazado o quitado, el tímpano no termina de cerrarse por falla en la curación, Si esto sucediera la perforación deberá ser cerrada quirúrgicamente en un tiempo diferido. :

- ***Hemorragia***

La hemorragia es el mayor riesgo de la adenoidectomía y la amigdalectomía. Aunque no es común, puede llegar a ser necesario si ocurriera transfusión de sangre e internación".Las muertes por hemorragias son extremadamente raras.

- ***Complicaciones anestésicas***

Las complicaciones anestésicas son muy raras pero pueden ser muy serias. Usted puede discutir esto con el anestesista si lo desea desde el momento que encomienda al cirujano su elección, quedando liberado éste de la responsabilidad por terceros, siendo por lo tanto el anestesista responsable por los actos y prácticas anestesiológicas.

He leído y comprendido, y he considerado y aceptado los riesgos y complicaciones de esta cirugía como consta arriba. Otros métodos y tratamientos alternativos han sido discutidos conmigo.

Firma:

Aclaración:

Documento:

(Paciente, Padres o Tutor)