

RIESGOS Y COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS

ESTAPEDECTOMÍA, TIMPANOTOMÍA Y OPERACIONES EXPLORATORIAS DEL ESTRIBO

■ Operaciones en el oído medio realizadas a través del conducto auditivo externo.

- **Mareos**

Alguna inestabilidad es común durante los primeros días del post-operatorio; mareos o súbita sensación de giro en la cabeza puede persistir por varias semanas. En raras ocasiones el mareo es prolongado.

- **Trastornos del gusto y sequedad de boca**

No es infrecuente trastornos del gusto y sequedad de boca por pocas semanas siguientes a la cirugía. En algunos pacientes este trastorno es prolongado.

- **Pérdida de audición**

En el 2% de los pacientes puede desarrollarse una pérdida de audición como consecuencia de alguna complicación en el proceso de reparación postquirúrgico. En el 1% de estos casos la pérdida es muy severa al punto de impedir el uso de audífono en el oído operado.

- **Acúfeno**

Si la audición empeora en el post-operatorio, el acúfeno (ruido en la cabeza) probablemente sea más pronunciado.

- **Perforación timpánica**

Puede producirse una perforación (agujero) en la membrana timpánica en menos del 1% y usualmente es debido a infecciones. Afortunadamente, la membrana puede curar espontáneamente. Si no se cierra espontáneamente, una operación (Miringoplastia) será necesaria.

- **Hipomotilidad de la cara**

Una complicación muy rara es la hipomotilidad de la cara. Esta es temporaria y puede ocurrir como resultado de una anomalía o tumefacción del nervio facial

Yo he leído y comprendido y he considerado y acepto los riesgos y complicaciones de esta cirugía como se detalla arriba. Métodos alternativos de tratamiento han sido discutidos conmigo

Firma:

Aclaración:

Documento:

(Paciente, Padre o Tutor)