

RIESGOS Y COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS

MIRINGOPLASTÍA

- Cierre de perforación en la membrana timpánica.

- ***Infeción ótica***

En raras ocasiones puede sobrevenir una infección del oído, con supuración, hinchazón y dolor en el postoperatorio debido a una baja capacidad de curación de los tejidos del oído. Si este fuera el caso, podría ser necesario una segunda intervención para controlar la infección.

- ***Pérdida de audición***

En un 2% de casos puede sobrevenir una caída de audición por motivo de la cicatrización. Pérdidas severas de la audición son extremadamente raras.

- ***Acúfeno***

Si la audición empeora en el postoperatorio, es probable que los acúfenos (ruidos en la cabeza) sean más pronunciados.

- ***Mareos***

Pueden sobrevenir mareos en el postoperatorio inmediato debido a la irritación de las estructuras del oído interno. Cierta inestabilidad puede persistir algunas semanas. Mareos prolongados son extremadamente raros.

- ***Trastornos del gusto y sequedad de boca***

No es rara que halla trastornos del gusto y sequedad de boca por algunas semanas después de la cirugía. En algunos pacientes esta molestia es prolongada.

- ***Hematoma***

Se presentan hematomas (colección de sangre) en un pequeño porcentaje de casos, lo que prolonga la curación. Una reoperación para quitar el coágulo puede ser necesaria si esta complicación se presenta. ,

- ***Complicaciones anestésicas***

Las complicaciones anestésicas son muy raras pero pueden ser muy serias. Usted puede discutir esto con el anestesista si lo desea desde el momento que encomienda al cirujano su elección, quedando liberado éste de la responsabilidad por terceros, siendo por lo tanto el anestesista el responsable de los actos y prácticas anestesiológicas.

He leído y comprendido, y he considerado y aceptado los riesgos y complicaciones de esta cirugía como consta arriba. Otros métodos y tratamientos alternativos han sido discutidos conmigo.

Firma:

Aclaración:

Documento:

(Paciente, Padres o Tutor)

